


## 北アメリカ・南アメリカの動物 【哺乳類1】




### アライグマ 茶 須 飯

分類：食肉目アライグマ科  
 英名：Common Raccoon  
 学名：Procyon lotor  
 分布：カナダ南部、北アメリカから中央アメリカ  
 体長：40～60cm 尾長：20～41cm  
 体重：4～13kg  
 生態：日本では外来種。夜行性で森林で生活している。しましまのしっぽに丸っこい体型だが木登りが得意。器用な脚で木に登り果実・木の実・昆虫・爬虫類・鳥の卵など何でも食べる雑食性。川辺では前足で水中を探りザリガニやカエル・魚を捕まえ、両前足でこするような仕草をしながら捕食する。

### カリフォルニアアシカ 城

分類：鯨目アシカ科  
 英名：California Sea Lion  
 学名：Zalophus californianus  
 分布：北アメリカ西岸  
 体長：オス 2.2～2.4m  
           メス 1.5～1.8m  
 体重：オス 350～450kg  
           メス 80～110kg  
 生態：オスはメスの3倍くらいの大きさがある。繁殖期になると1頭のオスに複数のメスが集まるハーレムを作る。ひれ状になった前足を翼のように使って水の中を泳ぐ。泳ぎの最大時速は40kmにもなる。イカ、タコ、魚などを食べる。




### ジェフロイクモザル 茶 小

分類：霊長目クモザル科  
 英名：Geoffroy's Spider Monkey  
           / Central American Spider-Monkey  
 学名：Ateles geoffroyi  
 分布：中央アメリカからコロンビア辺り  
 体長：オス 40～63cm  
           メス 31～45cm  
 尾長：オス 70～86cm  
           メス 64～65cm  
 体重：オス 7.5～9kg   メス 6～8kg.  
 生態：主に尾の先の内側には毛がなく、敏感になっており、器用で物をつかむことや自分の体をしっぽだけで支えることができる。熱帯雨林や落葉樹林などで群れをつくって暮らしている。主に果実や木の葉、まれに昆虫やカタツムリなども食べる。

### フサオマキザル 城 小 飯

分類：霊長目オマキザル科  
 英名：Brown Capuchin  
           / Tufted Capuchin  
 学名：Cebus apella  
 分布：ブラジル北西部、コロンビア、ベネズエラ  
 体長：40～55cm 尾長：40～50cm 体重：2～4kg  
 生態：頭部の両側に逆立った黒い房毛があることが名前の由来。熱帯雨林などに生息し、雑食性で昆虫類、鳥類の卵、果実、種子などを食べる。知能が高く、硬い木の実を石で叩き割るなど、道具を使っの採食が知られている。



### コモンリスザル 城 飯

分類：霊長目オマキザル科  
 英名：Common Squirrel Monkey  
 学名：Saimiri sciureus  
 分布：ブラジル、コロンビア、エクアドルなど  
 体長：25～30cm  
 尾長：35～42cm  
 体重：700～1100g  
 生態：オマキザル科の中では体が最も小さく、体の大きさや色がリスに似ていることから名前が付けられた。水辺近くの森林で数十頭ほどの群れをつくって、樹上生活をする。雑食性で果実や虫などを食べる。動きはとても素早く、樹上でも飛び上がって、飛んでいる昆虫を捕まえることができる。

### コモンマーモセット 飯

分類：霊長目キヌザル科  
 英名：Common Marmoset  
 学名：Callithrix jacchus  
 分布：ブラジルの東部から中部  
 体長：25～35cm 尾長：約30cm 体重：300～500g  
 生態：体毛の色は多色で、耳は白い長い毛で覆われている。森林で樹上生活をし、昆虫、カタツムリ、トカゲ、果実、種子などを食べる。10頭前後の家族で安定した群れを作り、父親や兄弟が協力して子育てをする。

