

身近な鳥類 【家禽・ペット】



ニワトリ 松

分類：キジ目キジ科
 英名：Chicken
 学名：Gallus gallus domesticus
 原産地：中国南部からフィリピン、マレーシア、タイなど
 生態：ジャングルに生息するセキショクヤケイを家畜化したものと現在では考えられている。肉用、卵用、観賞用などとして、いろいろな品種がいる。



シロウコッケイ 須小

分類：キジ目キジ科
 英名：Silky
 学名：Gallus gallus domesticus silky bantam white
 原産地：中国
 体重：0.8kg
 生態：頭部から足首まで、ふわふわの絹糸のような美しい羽が特徴。骨・皮・肉・内臓まで紫がかった黒色をしていることから、「鳥の羽色のように骨まで黒い鶏」の意味がある。国指定天然記念物。



ウズラチャボ 須

分類：キジ目キジ科
 英名：Rumpless Bantam
 学名：Gallus gallus domesticus uzura-chabo
 原産地：高知県
 体重：500~650g
 生態：高知県土佐地鶏の突然変異種で、尾羽と尾羽がとても短く、この姿がウズラ(鶉)に似ていることから、この名前がついた。別称ウズラオ(鶉尾)



ボリスブラウン 須

分類：キジ目キジ科
 英名：Boris Brown / Hy-Line Brown
 学名：Gallus gallus domesticus hi-line brown
 原産地：アメリカ
 体重：2~3.5kg
 生態：ロードアイランドレッド(アメリカ原産種)の改良品種。産卵鶏として日本で多く飼育されている。オスの羽色は白く、メスは茶色。メスは茶色の卵を産む。



信州黄金シャモ 須

分類：キジ目キジ科
 英名：Shinsyu-ougon Shamo
 学名：Gallus gallus (domestic) 83
 原産地：長野県
 体重：2.4~3.6kg
 生態：父鶏【華鶏】、母鶏【名古屋種】を掛け合わせて食肉用鶏として開発された改良種。長野県のブランド地鶏。オスは赤褐色、メスは黒い羽色をしている。



横斑プリマスロック 小

分類：キジ目キジ科
 英名：Barred Plymouth Rock
 学名：Gallus gallus domesticus barred plymouth rock
 原産地：アメリカ
 体重：オス 4.3 kg メス 3.4 kg
 生態：1874年に公認された。肉卵用に改良された品種。羽毛の白黒横帯が特徴。卵は茶褐色。



佐渡髭地鶏(サドヒゲジドリ) 小

分類：キジ目キジ科
 英名：Sado-higejitori
 学名：Gallus gallus domesticus sado-higejitori
 原産地：新潟県佐渡
 生態：佐渡の地鶏。卵をたくさん産まないため、数が少なくなっている。肉重が退化し、オス・メスともにあごの下とほほにヒゲのような羽毛があるのが特徴。

シチメンチョウ 松須

分類：キジ目キジ科
 英名：Wild Turkey
 学名：Meleagris gallopavo domesticus
 ※詳しくは北アメリカ・南アメリカの動物【鳥類】



養曳矮鶏(ミノヒキチャボ) 須

分類：キジ目キジ科
 英名：Japanese Long-saddled Bantam
 学名：Gallus gallus domesticus minohiki-chabo
 原産地：高知県
 体重：750~950g
 生態：シャモとショウコクを掛け合わせた種を小型に改良した品種。腰の部分に生える養羽(みのひね)が地面を引きずる(曳く)程に長いことが種名の由来。国指定天然記念物。

ウズラ 須

分類：キジ目キジ科
 英名：Quail (Japanese quail)
 学名：Coturnix japonica domesticus
 ※詳しくは日本で会える動物【鳥類1】

ホロホロチョウ 松須

分類：キジ目ホロホロチョウ科
 英名：Helmeted guineafowl
 学名：Numida meleagris
 ※詳しくはアフリカ周辺の動物【鳥類・爬虫類】

キンイロキンケイ 小

分類：キジ目キジ科
 英名：Yellow Golden Pheasant
 ※詳しくはアジア周辺の動物【鳥類2】

インドクジャク 松城須小飯

分類：キジ目キジ科
 英名：Common Peafowl / Indian Peafowl
 学名：Pavo cristatus domesticus
 ※詳しくはアジア周辺の動物【鳥類2】

シロクジャク 松須

分類：キジ目キジ科
 英名：White Peafowl
 ※詳しくはアジア周辺の動物【鳥類2】




シナガチョウ 茶城須飯

分類：カモ目カモ科
 英名：Chinese Goose
 学名：Anser cygnoides domesticus
 原産地：中国
 体長：40~60cm 体重：4~6kg



生態：サカツラガンを原種として改良された家禽。クチバシの付け根にこぶのような突起がある。体は大きくて飛翔できない。警戒心が強く見知らぬ人が来ると大声で鳴いて騒ぐため、番犬代わりに、又は草をよく食べるので除草用として飼育されている。




シロアヒル 城小

分類：カモ目カモ科
 英名：Domestic Duck
 学名：Anas platyrhynchos domesticus
 体長：50~80cm 体重：3~5kg
 生態：中国でマガモを原種とし品種改良したもの。クチバシは幅が広く、その両側には、ノコギリのようなギザギザがあり、草を食いちぎったり、しごいたりするのに都合のよい形をしている。



ジュズカケバト 茶

分類：ハト目ハト科
 英名：Barbary Dove
 学名：Streptopelia risoria domesticus
 体長：約25cm
 生態：全体的に淡い灰褐色で、首の後ろに黒いリング状の模様がある。古くから世界各地で飼育され、一部野生化している。



コールダック 須

分類：カモ目カモ科
 英名：Call Duck
 学名：Anas platyrhynchos domesticus call duck
 体長：30cm 体重：3kg
 生態：アヒルをさらに小型にした種なので、ペット用に育てられていることもある。ホワイトとブラウンなど沢山のカラーがある。



ジャコビン 小

分類：ハト目ハト科
 英名：Jacobin
 学名：Columba livia domesticus jacobin
 生態：人が作った種でイギリスで固定され、観賞用として飼育されています。特徴は首に横巻状の羽がある。



ツールーズ 城

分類：カモ目カモ科
 英名：Goose
 学名：Anser anser domesticus toulouse
 原産地：フランス
 体長：80~90cm 体重：9~14kg
 生態：ハイロガンからつくられた家禽。ガチョウの中では最も大きい種類。肝臓を肥大させたフォアグラが有名。

キエリボウシニコ 須小

分類：オウム目インコ科
 英名：Yellow-naped Amazon
 学名：Amazona auropallata ssp.
 ※詳しくは北アメリカ・南アメリカの動物【鳥類】

アオボウシニコ 松飯

分類：オウム目インコ科
 英名：Blue-fronted Amazon
 学名：Amazona aestiva
 ※詳しくは北アメリカ・南アメリカの動物【鳥類】

ルリコンゴウインコ 松須小飯

分類：オウム目インコ科
 英名：Blue-and-yellow Macaw
 学名：Ara ararauna
 ※詳しくは北アメリカ・南アメリカの動物【鳥類】

セキセイインコ 松須小

分類：オウム目インコ科
 英名：Budgerigar
 学名：Melopsittacus undulatus domesticus
 ※詳しくはオーストラリア周辺の動物【哺乳類・鳥類】



バリケン 城

分類：カモ目カモ科
 英名：Muscovy Duck
 学名：Cairina moschata domesticus
 体長：70~80cm 体重：3~4kg
 生態：南米産のバリケンを食用に家畜化したもの。眼~クチバシにかけて赤い皮膚が露出している。

ベニコンゴウインコ 小

分類：オウム目インコ科
 英名：Green-winged Macaw
 学名：Ara chloroptera
 ※詳しくは北アメリカ・南アメリカの動物【鳥類】

オカメインコ 松小

分類：オウム目オウム科
 英名：Cockatiel
 学名：Nymphicus hollandicus
 ※詳しくはオーストラリア周辺の動物【哺乳類・鳥類】