

北アメリカ・南アメリカの動物 【鳥類2・爬虫類】



シチメンチョウ (家畜種) ● ● ●

分類: キジ目キジ科
 英名: Wild Turkey / Common Turkey
 学名: *Meleagris gallopavo domestic*
 分布: カナダ南部、アメリカ合衆国、メキシコ
 全長: オス約 122cm メス約 60cm
 翼長: オス約 49cm メス約 44cm
 体重: オス約 10kg メス約 4kg

生態: キジ目最大種。開けた落葉樹と針葉樹の混合林に生息する。植物食傾向の強い雑食で果実、種子、昆虫類、両生類、爬虫類等を食べる。オスの頭から首にかけての肉垂の色が、興奮具合によって変化することが和名の由来となっている。食用とされることもあり、家禽としても飼育される。



カミツキガメ ● ● ●

分類: カメ目カミツキガメ科
 英名: Snapping Turtle
 学名: *Chelydra serpentina*
 分布: アメリカ合衆国、カナダ南部
 甲長: 最大約 60cm

生態: 肉食性が強く、魚・小動物などを捕食する。日本ではペットとして飼われていたものが、野外に放されて繁殖しており、特定外来生物に指定されている。



ミシシippアカミミガメ ● ● ●

分類: カメ目マダガメ科
 英名: Red-eared Slider
 学名: *Trachemys scripta elegans*
 分布: アメリカ合衆国ミシシipp川流域
 甲長: 最大約 30cm 体重: 400g から 2kg

生態: アメリカ原産の外来種。「ミドリガメ」の名前で広く知られている。頭部両側に橙赤色の斑紋が目立つ。日本では野外に遺棄され問題となっている。



オオカナダガン ●

分類: カモ目カモ科
 英名: Canada Goose
 学名: *Branta canadensis moffitti*
 分布: 【夏季】グレートプレーンズ北部(繁殖) 【冬季】米国南部~メキシコ北部(越冬)
 全長: 最大約 110cm 体重: 2.3~6.8kg
 生態: 湖沼、水田など様々な水辺環境に生息し、水草の根・茎・葉・実などを食べる。亜種により大きさの違いが著しい。特定外来生物(外来生物法)に指定されている。



ワニガメ ●

分類: カメ目カミツキガメ科
 英名: Alligator Snapping Turtle
 学名: *Macrolemys temminckii*
 分布: アメリカ合衆国南部

甲長: 最大約 80cm 体重: 最大 113kg
 生態: 口を大きく開けて口腔内の舌をミミズのように動かし、近寄ってきた魚を捕食する「ルアーリング」と呼ばれる捕食方法をとる、待ち伏せ型のカメ。



ベニイロフラミンゴ ●

分類: フラミンゴ目フラミンゴ科
 英名: American Flamingo
 学名: *Phoenicopterus ruber ruber*
 分布: アメリカのフロリダ半島、ガラパゴス諸島、南アメリカ北部。
 全長: 120~140cm
 体重: 2~4kg
 生態: フラミンゴの中ではもっとも大きい。全身が鮮やかな紅色。塩湖や干潟に大群で生息。水生昆虫や小型の甲殻類などを食べる。



アカダイショウ ●

分類: 有鱗目ナミヘビ科
 英名: Corn Snake
 学名: *Elaphe guttata*
 分布: アメリカ合衆国東南部
 全長: 120~180cm
 生態: 日本のアオダイショウを赤くしたような種で、生態もよく似ている。英名の「コーンスネーク」は、トウモロコシ畑によく現れることや、体の模様インディアンコーンというトウモロコシの模様に似ていることからついたといわれている。ペットとして広く飼育されており、体色もさまざまなバリエーションがある。




チリーフラミンゴ ● ● ● ●

分類: フラミンゴ目フラミンゴ科
 英名: Chilean Flamingo
 学名: *Phoenicopterus chilensis*
 分布: ペルーからチリ南端、ブラジルからアルゼンチン
 全長: 100~120cm 体重: 2~3.5kg
 生態: 高山帯の塩水湖、干潟などで数百から数千羽の大きな群れをつくって暮らす。水生昆虫や藻類などを食べる。体は淡いピンクで、脚の真ん中の関節と足先の指と水かきか赤い色をしている。



カリフォルニアキングスネーク ●

分類: 有鱗目ナミヘビ科
 英名: California Kingsnake
 学名: *Lampropeltis getula californiae*
 分布: アメリカ合衆国西部、メキシコ北部
 全長: 150cm 以下
 生態: 乾燥した森林から岩山、農地、住宅街とさまざまな環境に生息している。他のヘビも捕食してしまうことからキングという名前がついた。ペットとして広く飼育されており、体色や模様もヨコジマやタテジマなどもさまざまなバリエーションがある。



フンボルトペンギン ● ● ●

分類: ペンギン目ペンギン科
 英名: Humboldt Penguin
 学名: *Spheniscus humboldti*
 分布: ペルー北部からチリの中部
 全長: 55~72cm 体重: 3.5~6kg
 生態: 胸に黒帯模様がある。年に一度、換羽期があり全身の羽が生え変わる。温帯性のペンギンで、海中を泳ぎながら、小魚の群れを追って採食する。泳ぐ速度は7~10km/h。岩穴や砂を掘ったトンネルの中に巣をつくる。日本で一番多く飼われているペンギンだが、産卵場の環境破壊などのため、野生の個体数は減少している。




グリーンイグアナ ●

分類: 有鱗目イグアナ科
 英名: Green Iguana
 学名: *Iguana iguana*
 分布: メキシコ、中南米、西インド諸島
 体重: 3~5kg
 全長: 最大 180cm
 生態: 熱帯雨林に生息し、水辺を好み、泳ぎも上手い。水面に張り出した樹上にいることが多い。植物の葉や花、果実などを食べる。幼体は鮮やかな緑色だが、成長すると黒っぽくなる。



カンムリサケビドリ ●

分類: カモ目サケビドリ科
 英名: Southern Screamer
 学名: *Chauna torquata*
 分布: 南アメリカ中東部
 全長: 80~95cm
 体重: 3~4.5kg
 生態: 湿地、湖沼、草原などの水辺を歩き回って、植物の種子や葉などの餌を探す。両翼翼角部分に爪が生えている。遠くまで聞こえる大声で鳴くことから、この名前がついた。



アンデスコンドル ●

分類: タカ目コンドル科
 英名: Andean Condor
 学名: *Vultur gryphus*
 分布: 南アメリカ大陸
 全長: 1~1.3m 体重: 7~15kg
 翼開長: 最大 3m
 生態: アンデス山脈に生息。空を飛び鳥の中で世界最大級。羽を広げると3mほどにもなる。気流によって滑空する。動物の死体に頭を突っ込んで肉を食べるため、頭部の汚れが落ちやすいように羽毛が生えていないとされる。寿命は50~70年。